

ما هو النالوكسون؟

نصائح السلامة من المواد الأفيونية

النالوكسون



- النالوكسون دواء يعكس بشكل مؤقت آثار جرعة زائدة من المواد الأفيونية
- يعمل النالوكسون إذا كان الشخص لديه مواد أفيونية في جسمه مثل الفنتانيل أو الهيروين أو المواد الأفيونية الموصوفة طبيًا
- يمكن إعطاء النالوكسون كل 2-3 دقائق حتى يبدأ الشخص في التنفس مرة أخرى
- لا يمكن لأي شخص أن ينتشي أو يصبح مدمنًا على النالوكسون

النالوكسون فعال فقط لمدة 30 - 120 دقيقة



يمكن الوقاية من الوفاة بسبب الجرعات الأفيونية الزائدة. اتخذ إجراءً فوريًا تعلم كيفية استخدام النالوكسون وإنقاذ حياة.

الموارد

الإدمان في ميشيغان للمواد الأفيونية
michigan.gov/opioids

التدريب على إدارة النالوكسون عبر الإنترنت
overdoseACTION.org



معلومات عن النالوكسون -
مسح رمز الاستجابة السريعة
michigan-open.org/naloxone/

SAMHSA خط المساعدة الوطني

خدمة ومعلومات علاجية مجانية وسرية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع و 365 يومًا في السنة لأي شخص يواجه اضطرابات عقلية أو اضطرابات تعاطي مواد الإدمان. 1-800-662-مساعدة (4357)

Michigan-OPEN.org | medicqi.org

يتم تمويل OPEN جزئيًا من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان

<https://doi.org/10.56137/OPEN.000042>

تم التحديث في 03.23


تعليمات رذاذ النالوكسون الأنفي

1



قم بإزالته من العبوة

2



ضع الفوهة في الأنف

3



اضغط على المكبس للرش
لا حاجة لرش الاختبار

لا تتأخر في الاتصال 911

- لا تحقن الشخص بأي شيء
- لا تضع الشخص في حمام أو دش
- لا تعطي الشخص أي شيء ليشربه
- لا تصب الماء على وجه الشخص

يحميك قانون ميشيغان من المسؤولية عند إعطاء النالوكسون الاتصال برقم 911 لشخص يعاني من جرعة زائدة

كيف يمكنك تقليل الضرر

- لا تخط المواد الأفيونية مع أدوية أخرى خاصة البنزوديازيبينات أو أي شيء يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس
- كن على دراية بتغيرات تحمل الجسم
- أخبر العائلة / الأصدقاء عن مكان تخزين النالوكسون وكيفية استخدامه
- تباطأ ، لا تستخدم المخدرات بمفردك ، احمل النالوكسون

تذكر أن تتخذ إجراء

التجنب

- اصرخ باسم الشخص
- هز أكتافهم بقوة
- التدليك الصدري: افركي عظام القص بمفاصلك



ابحث عن علامات الجرعة الزائدة:

- تباطأ أو توقف التنفس
- شفاه زرقاء / رمادية أو أطافر
- أصوات الشخير العميق / الغرغرة
- لا تستجيب للألم
- تحديد التلاميذ



اتصل ب 911:

- قل لهم ، "أعتقد أنها جرعة زائدة"

النالوكسون داخل الأنف:

- أعط النالوكسون



أوكسجين:



- خذ أنفاس إنقاذ:
 - إمالة رؤوسهم للخلف
 - قرصة أنفهم
- حياة الذقن نفس واحد كل 5 ثوان
- أو CPR إذا كنت تعرف كيف
- أو اتبع تعليمات التقديم



النالوكسون مرة أخرى:

- كرر النالوكسون كل 2-3 دقائق حتى يبدأ الشخص في الاستيقاظ
- إذا اضطرت إلى مغادرة الشخص ، أو حدث القيء ، فضعه في وضع الاسترداد (أدناه)



ابق مع الشخص حتى وصول المساعدة ، إذا كان ذلك آمنًا

