

¿QUÉ ES LA NALOXONA?

- La naloxona (Narcan®) es un medicamento que revierte temporalmente los peligrosos efectos de una sobredosis por opioides
- Funciona si una persona tiene opioides en el cuerpo, como fentanilo, heroína u opioides recetados
- La naloxona puede administrarse cada 2 o 3 minutos hasta que la persona vuelva a respirar
- Una persona no puede drogarse con naloxona ni volverse adicta a ella

ES EFICAZ SOLO por un período de 30 a 120 minutos



La muerte por sobredosis de opioides puede prevenirse. **ACTÚE** de inmediato. Aprenda a usar la naloxona y salve una vida.

RECURSOS

Adicción a los opioides en Michigan

- michigan.gov/opioids

Formación en línea sobre la naloxona

- overdoseACTION.org

Información sobre la naloxona. Escanee el código QR

- michigan-open.org/naloxone/

Línea nacional de ayuda de la SAMHSA

Servicio gratuito y confidencial de información y remisión para tratamientos, disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año, para personas con trastornos mentales o por abuso de sustancias. 1-800-662-HELP (4357)



SEGURIDAD DE
LOS OPIOIDES

INFORMACIÓN QUE DEBE
SABER:

NALOXONA



Michigan-OPEN.org | medicqi.org

OPEN recibe financiamiento parcial del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan

<https://doi.org/10.56137/OPEN.000041>

Información actualizada en marzo de 2023

OPEN  **MEDIC**
Evidence. Resources. Engagement. MICHIGAN EMERGENCY DEPARTMENT
IMPROVEMENT COLLABORATIVE


INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SPRAY INTRANASAL DE NALOXONA

1



Abra el paquete

2



Coloque el inyector en la nariz

3



Presione el émbolo para rociar

No es necesario rociar para probar el dispositivo

NO se demore en llamar al 911

- No le inyecte nada a la persona
- No ponga a la persona en la bañera ni la ducha
- No le dé nada para tomar
- No le eche agua en la cara

La legislación de Michigan le exime de responsabilidad cuando administra naloxona y llama al 911 en caso de que una persona sufra una sobredosis

REDUZCA LOS DAÑOS

- No mezcle opioides con otros medicamentos, sobre todo con benzodicepinas o cualquier cosa que le pueda dar sueño
- Sea consciente de los cambios en la tolerancia corporal
- Informe a sus familiares y amigos dónde almacena la naloxona y cómo utilizarla.
- Actúe con calma, nunca consuma drogas solo, lleve consigo naloxona

RECUERDE ACTUAR DE INMEDIATO

DESPIERTE A LA PERSONA:



- Grite el nombre de la persona
- Sacuda vigorosamente los hombros
- Frote el esternón con los nudillos: frotación esternal

COMPROBAR SI HAY SEÑALES DE SOBREDOSIS:



- Respiración lenta o ausencia de respiración
- Labios o uñas de color azul o gris
- Ronquidos profundos y ruidos de gorgoteo
- Sin respuesta al dolor
- Pupilas contraídas



LLAMAR AL 911:

- Dígame al personal de emergencias: "Creo que tiene una sobredosis"



NALOXONA INTRANASAL:

- Dele naloxona

OXÍGENO:



- Respiración boca a boca:
 - Coloque la cabeza hacia atrás
 - Pellizque la nariz
 - Levante la barbilla
 - Dé 1 respiración cada 5 segundos
- O practique RCP si sabe hacerlo
- O siga las instrucciones del personal de emergencias



DAR NALOXONA NUEVAMENTE:



- Dele la naloxona cada 2 a 3 minutos hasta que la persona empiece a despertar
- Si debe dejar a la persona, o se producen vómitos, colóquela en posición de recuperación (más abajo)

Quédese con la persona hasta que llegue la ayuda, si es seguro hacerlo

